

β-Protect

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO - AGITE ANTES DE USAR

CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante foliar líquido de origen vegetal. **β-Protect** proporciona aminoácidos vegetales en alta concentración, en particular Glicinbetaína, una molécula con acción osmoprotectora que la planta acumula de forma natural, respondiendo a las condiciones de estrés ambiental, como altas y bajas temperaturas (estrés térmico), sequía (estrés hídrico) y concentración elevada de sales (estrés salino).

La Glicinbetaína presente en **β-Protect** mantiene la estructura de las paredes y membranas celulares y preserva la capacidad para realizar las funciones metabólicas. Además, conserva la turgencia celular impidiendo la pérdida excesiva de agua y el colapso de la célula.

COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Nitrógeno (N) Orgánico	5,0 % p/v
Glicinbetaína	34,5% p/v
Aminoácidos	3,5 % p/v
Materia Orgánica	22 % p/v

pH: 5,67

Densidad g/L a 20°C: 1,15

Elementos contaminantes: Plomo (Pb)<0,5mg/Kg; Cadmio (Cd)<0,5mg/Kg; Arsénico (As)<0,5mg/Kg; Mercurio (Hg) <0,5mg/Kg

PRESENTACIÓN

1L – 5L -20L

β-Protect

DOSIS RECOMENDADA DE USO

CULTIVO	Foliar cc/100 L	Foliar L/ha	Fertirriego L/ha	Observaciones
Cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, nectarino	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	Realizar 3 a 4 aplicaciones desde floración hasta término crecimiento vegetativo de la planta.
Manzano, peral	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	3 a 4 aplicaciones desde floración hasta término crecimiento vegetativo de la planta.
Almendro, avellano europeo, nogal	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	
Cítricos, palto, olivo	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	Realizar 3 a 5 aplicaciones en floración y/o cuaja.
Uva mesa, uva vinífera, kiwi	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	Realizar 3 a 4 aplicaciones desde brotación y en momentos de alta incidencia de estrés abiótico.
Arándano, frutilla, frambueso, mora	300-500	3,0-5,0	5,0-10,0	Realizar 3 a 4 aplicaciones en brotación y durante todo el cultivo ante incidencia de estrés abiótico.
Hortalizas y Ornamentales	200-300	2,5-3,0	5,0-10,0	Dosis por aplicaciones, a lo largo de todo el cultivo, cada 7-10 días.
Almácigo e Hidroponía	150-200	-	-	
Industriales: Papa, Raps, Tomate, Tabaco, Remolacha azucarera	-	2,5-3,0	-	Dosis por aplicación, realizar 2 a 3 aplicaciones en momentos de alta incidencia de estrés abiótico.

Distribuido por:

ANSAGRO S.A.

Rosario Norte 615, piso 23,
Las Condes, Santiago – CHILE

Tel. +562 2571 5400

contacto@empresasiansa.cl

www.empresasiansa.cl

Fabricado por:

ED&F MAN LIQUID PRODUCTS
SRL ITALIA

NOTAS AL USUARIO:

Iansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.