FICHA TÉCNICA

lansafrut® Boro

COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Boro (B)	8% p/v
Complejado con Azúcares y Ác. Orgánicos	

pH: 7,5 - 8,5
Densidad g/L a 20°C: 1.200

CARACTERÍSTICAS

lansafrut® Boro es un corrector de deficiencias líquido en base a un complejo orgánico, soluble en agua y formulado para aplicación foliar.

Beneficios del Producto
- Ayuda a la síntesis de proteínas
- División y elongación celular
- Desarrollo del tubo polínico y cuaja de frutos

Compatibilidad
lansafrut® Boro es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios en uso, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Preparación de la mezcla
lansafrut® Boro se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador lleno hasta la mitad con agua y completar a volumen total mientras se agita.
Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Período de Carencia
No tiene restricciones de carencia.

Precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar protección adecuada, lavarse las manos después de realizado el trabajo y antes de comer.
- Eliminar el envase luego de la aplicación.
- No almacenar con productos alimenticios.
- Elimine el envase una vez vacío realizando un triple lavado. Luego destrúyalo y deposítelo en un lugar habilitado por la autoridad competente.

Fitotoxicidad
No es tóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede aplicarse dirigido al follaje, frutos y brotes procurando un mojamiento y uniformidad adecuada.

08.2025

FICHA TÉCNICA

Iansafrut® Boro

DOSIS RECOMENDADA DE USO

CULTIVO	Dosis L/Ha	Concentración cc /100L	Momento de Aplicación
Pomáceas	1,0-1,5	100-150	Aplicar en inicio de floración, 2 aplicaciones. Desde fruto cuajado junto con Iansafrut® Calcio, 3 a 5 aplicaciones. Opcionalmente en post cosecha.
Carozos, Cerezos	1,0-1,5	100-150	Desde puntas verdes, 1-2 aplicaciones. Desde fruto cuajado hasta quiebre de color junto con Iansafrut® Calcio, 2-3 aplicaciones cada 7 días. Opcionalmente en post cosecha.
Uva de mesa, Uva Vinífera	1,0-1,5	100-150	Aplicar en inicio de floración, 2 aplicaciones. Desde baya cuajada hasta cierre de racimos, 3 aplicaciones junto con Iansafrut® Calcio.
Paltos, Cítricos, Olivos	1,0-1,5	100-150	Aplicar en panícula expuesta o inicio de flor (50%). Realizar 1 a 2 aplicaciones cada 10-15 días.
Avellano europeo, Nogales, Almendros	1,0-1,5	100-150	Desde botón floral. Realizar 2-3 aplicaciones.
Berries, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	1,0-1,5	100-150	Desde floración y durante crecimiento de bayas. En mezcla con Iansafrut® Calcio bajar la dosis a la mitad.

PRESENTACIÓN

20L

Distribuido por: IANSAGRO S.A.
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes, Santiago – CHILE Tel. +562 2571 5400
contacto@empresasiansa.cl www.empresasiansa.cl
Fabricado por:
QAUS SPA

NOTAS AL USUARIO:

Iansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.