FICHA TÉCNICA

lansafrut® Zinc

COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Zinc (ZnO)	8% p/v
Complejado con Azúcares y Ác. Orgánicos	

pH: 4,0-5,0
Densidad a 20°C: 1200 g/L

CARACTERÍSTICAS

lansafrut® Zinc es un corrector de deficiencias líquido en base a un complejo orgánico, soluble en agua y formulado para aplicación foliar.

Beneficios del Producto
• Estimula la fotosíntesis.
• Aumento de tamaño de hojas, brotes y frutos.
• Aumenta viabilidad del polen.
• Evita clorosis (hojas amarillentas).
• Forma parte de la zeatina, precursora de citoquininas.
• Amplio espectro de acción.
• Acción sistémica y prolongado efecto.

Compatibilidad
lansafrut® Zinc es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios en uso, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Preparación de la mezcla
lansafrut® Zinc se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador lleno hasta la mitad con agua y completar a volumen total mientras se agita.
Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Período de Carencia
No tiene restricciones de carencia.

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Usar protección adecuada, lavarse las manos después de realizado el trabajo y antes de comer.
• Eliminar el envase luego de la aplicación.
• No almacenar con productos alimenticios.
• Elimine el envase una vez vacío realizando un triple lavado. Luego destrúyalo y deposítelo en un lugar habilitado por la autoridad competente.

Fitotoxicidad
No es tóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede aplicarse dirigido al follaje, frutos y brotes procurando un mojamiento y uniformidad adecuada.

08.2025

FICHA TÉCNICA

Iansafrut® Zinc

DOSIS RECOMENDADA DE USO

CULTIVO	Dosis L/Ha	Concentración cc /100L	Momento de Aplicación
Pomáceas	1,5-2,0	150-200	Aplicar desde puntas verdes. Realizar 3-4 aplicaciones.
Carozos, Cerezos	1,5-2,0	150-200	Aplicar a inicio de floración (1-2 aplicaciones) y repetir post cuaje hasta quiebre de color, realizar 2-4 aplicaciones.
Uva de mesa, Uva Vinífera	1,5-2,0	150-200	Aplicar con brote de 20 cm hasta floración, 2-3 aplicaciones. También desde cuaja hasta pinta, realizar 2-3 aplicaciones.
Paltos, Cítricos, Olivos	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración junto con Iansafrut® Boro. Repetir en brotes rojos, realizando 2 aplicaciones cada 15 días.
Avellano europeo, Nogales, Almendros	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración junto con Iansafrut® Boro. Repetir en brotación, realizando 2 aplicaciones cada 15 días.
Berries, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración y durante crecimiento de fruto, realizar 2-3 aplicaciones.

PRESENTACIÓN

20L

Distribuido por: IANSAGRO S.A.
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes, Santiago – CHILE Tel. +562 2571 5400
contacto@empresasiansa.cl www.empresasiansa.cl
Fabricado por:

NOTAS AL USUARIO:

Iansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.